

本期 內容

蚊子能在不同的地方滋生
請保持警覺

辨識不同種類的蟲鼠
對防治工作的重要性

蚊子能在不同的地方滋生 請保持警覺

本港有超過70種不同的蚊子。很多人都誤以為蚊子只會在積水繁殖，但事實並非如此。按品種而定，蚊子有很多不同的繁殖生境。我們首先要對不同的蚊子繁殖生境有所認識，才能及早發現需要防治的蚊種和實行有效的防治措施。（防治蚊患建議可在食物環境衛生署網頁 (www.fehd.gov.hk) 內找到。）

白紋伊蚊是登革熱病媒，喜歡在範圍細小的水體繁殖，例如沙井蓋的匙孔、樹洞、竹枝殘幹、棄置輪胎、岩石上的水窪、沙隔、有積水的排水明渠；以及帆布、容器、花盆墊盤或甚至落葉上的積水。三帶喙庫蚊是日本腦炎病媒，通常在長有植物的積水農田繁殖。由於慣常繁殖的生境面積都比較大，這種蚊在雨季的數量可以非常多，特別是在新界等低窪地區。致倦庫蚊是西尼羅河熱病媒，在受污染的水體繁殖。這種蚊在本港隨處可見。

上述所有蚊種都能在蘊含大量有機物的水體生存。不過，也有其他蚊種只能在清澈的水中生存。例如微小按蚊，這種瘧疾病媒只會在潔淨而流速緩慢，邊旁長有植物及陽光散射的溪澗繁

很多不同種類的
蚊子都在流速緩
慢的水中繁殖

殖。在新加坡等國家被視為瘧疾病媒的多斑按蚊也在類似的生境繁殖，但較喜歡棲息於無遮蔭溪澗旁邊的隱蔽水窪。

有些蚊種是在“特殊”生境繁殖的。例如：海濱庫蚊在半鹹淡水體繁殖；東鄉伊蚊在近岸岩石上積存的鹹水繁殖；彭湖伊蚊在潮水漲退範圍內的蟹洞繁殖；蘇門答臘庫蚊和巨型阿蚊在瓶子草中繁殖；蛛形杵蚊在竹枝殘幹繁殖；騷擾阿蚊在受尿液污染的水體繁殖；常型曼蚊在有水生植物（例如水浮蓮）的池塘繁殖。上文所述各類蚊子，其中有些會傳播疾病，影響公眾衛生；有些則只屬滋擾性的害蟲。



巨型阿蚊和蘇門答臘庫蚊
在瓶子草中繁殖



蛛形杵蚊只在
竹枝殘幹繁殖



