

要避免被蚊子叮咬，應採取以下措施：

1. 穿淺色的長袖上衣和長褲。
2. 把褲腳塞進襪子或長靴裡。
3. 把含避蚊胺成分（濃度為百分之二十或以上）的昆蟲驅避劑*，按產品標籤上的指示施用在衣物或外露的身體部位。懷孕工人使用的昆蟲驅避劑所含避蚊胺濃度最高只應達百分之三十。
4. 在防曬霜及昆蟲驅避劑兩者兼用時，先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑。

* 如欲取得更多的資訊，可參閱衛生署、衛生防護中心及食物環境衛生署製作的「正確使用昆蟲驅避劑」單張。

更多資料：

在工作時如需使用殺蟲劑，應事先接受相關訓練和得知應採取哪些預防措施，並應遵從僱主給予的安全指引。

如欲取得更多職業健康資料，請與勞工處聯絡：

電話：**2852 4041**

電郵：**enquiry@labour.gov.hk**

如欲得到更多登革熱或寨卡病毒感染資料，可透過以下途徑索取：

衛生防護中心網站：**www.chp.gov.hk**


24小時健康教育熱線：**2833 0111**

如欲進一步查詢建築地盤防控蚊患事宜，可透過以下途徑提出：

食物環境衛生署網站：**www.fehd.gov.hk**

查詢熱線：**2868 0000**


給建築地盤工人的 防蚊指引



蚊叮不僅引致皮膚痕癢或紅腫，也會傳播疾病。白紋伊蚊能傳播登革熱和寨卡病毒。即使只有少量積水，白紋伊蚊也可滋生。



現時並無有效疫苗可以預防登革熱和寨卡病毒感染。要預防登革熱和寨卡病毒感染，關鍵在於清除蚊子的滋生地和預防蚊叮。



要清除蚊子的滋生地，應採取以下措施：

1. 確保坑道、升降機井道、污水處理設施、水馬、貯水箱、帆布、廢棄輪胎、建築設備、機械組件及其他常見積水黑點沒有積水。



2. 如難以接近積水或無法清除積水，應向管理人員報告，以便立即跟進(例如施用滅蚊幼蟲劑等)。
3. 遮蓋所有容器，以防積水導致蚊蟲滋生。
4. 把空餐盒和空罐等垃圾棄置在有蓋垃圾桶內。
5. 把建築物料和可盛水器皿存放在遮蔽地方。
6. 不要干擾任何防蚊措施(例如不要移除竹棚末端的包裹物料等)。
7. 每周至少一次清理建築廢料。
8. 每周至少一次把凹坑、坑道、渠道、洗車站等的積水徹底排去。

