

酒吧及卡拉OK： 2019冠狀病毒病的預防措施

香港大學


預防2019冠狀病毒病在酒吧及卡拉OK的傳播

1. 使用外科口罩而非N95至N100的過濾口罩 (因當工作或運動時會引致氣喘;當飲食或在家時不能使用);
2. **快速換氣量:** 高流量的空氣會在健康接觸者吸入前快速帶走呼出少於5um 的噴霧微粒; 足夠新鮮空氣能稀釋病原體，監察二氧化碳的水平以確保空氣系統全面運作；
3. **快速空氣消毒:** 使用高效顆粒空氣過濾技術或加裝具備紫外線-C 的照射消毒設備；
4. 減少脫去外科口罩的時間(應該多於 **95%** 的時間戴上口罩)，享用飲品時使用彈性飲管；離開酒吧前更換口罩，邀請名人拍宣傳短片以推廣有關做法；
5. 只輕聲說話，不要大聲說話；
6. 時常使用手提電話記錄曾到訪的食肆／乘座的的士／小巴: 如沒有使用政府感染風險通知流動應用程式及二維碼，請記下名稱、地址及電話號碼；
7. 對非法的樓上酒吧及向**18歲**以下人士售酒的便利店**嚴厲執法**。

佩戴着口罩並以彈性飲管享用飲品



可重用柔軟而富彈性的矽飲管



觀賞影片 

由口罩底部容易通過