






登革熱病媒的防治





瞧瞧！不用放大鏡，
你們也會感覺到
我們的厲害呀！



我有苗條身材、
背部有一條長長
白線、腳有黑白相間花紋、
頭有長長的刺吸式口器……
哈哈！
我是何方神聖……
人類通常稱我做
白紋伊蚊。



在公園的一角，
堆積了舊車咁和空飯盒等垃圾，
並有一個人隨處拋棄廢物。




空飯盒內有積水，
正適合我產卵，繁殖下一代。
現在就去覓食啦！

在公園的另一角，
一班小朋友在遊玩。

哈哈……
好玩呀！

等等，各位停一停，
我們找到了獵物，快來
飽吃一頓吧！











吓！滅蚊大使？

我就是滅蚊大使，
讓我消滅牠們啦！



唏！你好！



就讓我來消滅你們吧！



是滅蚊大使！大家快逃，
會沒命的，哎……



走不掉了……
全軍覆沒了。

太好了！
蚊子全被消滅了！

滅蚊大使，這是甚麼蚊呀？

喜歡在甚麼時候出沒呢？

牠們又怎樣滋生呀？



就讓我來詳細
告訴你們。



牠們叫白紋伊蚊，胸背有白線，
腳部有白間。牠們的飛行能力不強，
大約 100 米。



雌蚊喜歡在白天叮人。
日出後兩小時及日落前
兩小時是牠們活動的
高峰時間。



白紋伊蚊喜歡在天然或人造積水容器中滋生，如棄置飯盒……等。





蚊卵在水中孵化及生長，約 7 天後蛻變為成蟲。卵的抗旱力極強。



卵 (2-3 天)



蛹 (1-3 天)



孑孓 (4-7 天)





我明白啦！



被白紋伊蚊叮咬，
除會痕和痛外，會否
感染疾病呀？



白紋伊蚊會
傳播登革熱病。.




感染登革熱是怎樣的？

登革熱人會令人出現嚴重頭痛、發高燒、皮膚出疹、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛，而登革熱所引起的併發症更有可能導致死亡。
登革熱的潛伏期為 3 至 14 日。

A cartoon illustration of a green mosquito with large white eyes and blue hands. It has a shocked expression with its mouth open. A speech bubble originates from its mouth, containing the text about dengue fever symptoms and incubation period.



哇，很嚴重呢！



如果不想被牠叮咬，
就要做好預防措施。



由於蚊子由卵變為成蟲
需時約 7 天，住戶應
每週視察家居。

立即行動

每週更換花瓶
內的水

清除地面積水

清除盆栽
墊盤積水

HOT
清除屋外冷氣機
托盤積水

清除雪櫃
底盤積水

貯存的水要
蓋好，防止
蚊子接觸水面

每週至少一次更換
家居容器藏水，並
清洗墊盤以便將可
能存在的蚊卵擦掉。



那麼戶外的問題又
應該如何處理呢？




你們要定期清除溝渠
及排水渠內的垃圾及落葉，
以防淤塞。



其他防止蚊子滋生的措施


也包括



關好貯水箱蓋




覆蓋匙孔




用泥土將竹枝殘幹填封








經常清理落葉



經常清理排水渠，以防積水



戶外容器用蓋子蓋好
或放在有遮蔽的地方






你們也要 … …



我知道，就是不要胡亂
棄置空氣水罐、食物盒、垃圾 … …



我們通常都會在戶外活動，
又應該怎樣做？



在衣服上施用昆蟲驅避劑，
避免逗留在草叢，穿上淺色
長袖衫及長褲。

不要塗抹帶有氣味的化妝品，
例如香水或潤膚露等。



如果在公眾地方見到有蚊子或
可能滋生蚊子的環境，我們又
應該怎樣做？



你們可致電

1823 舉報





我們立刻回家
告訴爸爸和媽媽。

現在我再出發啦！
記緊要防蚊呀！再見！



食物環境衛生署出版
政府物流服務署印 (03/2025)