

病媒控制


成蚊控制

- 使用捕蚊器誘捕成蚊；
- 使用蚊香或殺蟲噴霧殺滅成蚊；
- 使用符合規格及專門設計用於殺滅成蚊的電子設備。



蚊子幼蟲控制

- 清除蚊蟲滋生地；
- 於不能清除的積水處，施用合適的殺幼蟲劑殺滅蚊子幼蟲；
- 在合適的水體(如人工觀賞水池)內放入捕食蚊子幼蟲的魚類。



使用殺滅成蚊或蚊子幼蟲的產品時，必須遵照產品的標籤指示及安全措施，或聘請滅蟲公司進行相關工作。

預防蚊叮

- 進行戶外活動時，
 - ✓ 應穿着淺色的長袖衫和長褲；
 - ✓ 應避免使用會產生氣味的化妝品，例如香水；
 - ✓ 按產品標籤指示在衣服及外露的皮膚上施用含避蚊胺、派卡瑞丁或IR3535的昆蟲驅避劑；
 - ✓ 如需同時使用防曬霜及昆蟲驅避劑，應先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；
 - ✓ 避免於有蚊患的地方逗留。
- 按需要安裝防蚊網，以免蚊子飛進室內範圍。

如欲索取更多預防及
控制蚊患的資料，請瀏覽



預防與控制


基孔肯雅熱 病媒的建議



基孔肯雅熱

基孔肯雅熱是一種由病毒引起，透過受感染的雌性伊蚊叮咬人而傳播的疾病。『基孔肯雅』是源於坦桑尼亞南部馬孔德語中的一個詞，意思是『變得扭曲』，描述患者因嚴重關節疼痛彎腰的模樣。

當未受感染的雌性伊蚊叮咬了基孔肯雅熱的患者後，該雌性伊蚊便有機會感染基孔肯雅病毒，當牠再叮咬其他健康人士時，便會把疾病傳播。因此，消滅病媒蚊子及防止被蚊叮咬，對於截斷疾病的傳播至為重要。



本地病媒

香港常見的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱、登革熱及寨卡病毒感染。雌性的白紋伊蚊於日間活動，並於日出後兩小時及日落前兩小時內最為活躍。白紋伊蚊必須於水中繁殖，尤其是細小的積水處。



病媒預防及控制措施

清除病媒滋生地

1 收拾處所，並定期檢查處所內是否有積水，特別在下雨後。



2 清除所有不必要的積水並消除滲漏源頭。

3 每星期至少更換花瓶內的水一次，並洗刷花瓶內壁。



4 每星期至少清倒花盆底碟裏的水一次，或避免使用花盆底碟。

5 定期翻動盆栽植物的泥土，以避免其表面變硬而導致積水。



6 妥善蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面。



7 清理倒置容器的凹陷處及容器蓋面的積水。



8 妥善處置能盛水的物品或垃圾，例如即棄餐盒、空罐和棄置輪胎。

9 切勿在農運徑或政府土地貯水作灌溉用途。

