

## 學校的防治蟲鼠工作

學校為學生提供一個適當的學習環境。大量的人群聚集在校園，當中又以兒童和青少年居多。另一方面，校園亦可能是一個適宜各種對人類健康有害的蟲鼠生長的地方，尤其是當校園為這類蟲鼠提供了易於覓食、躲藏和繁殖的環境，更容易成為蟲鼠聚居之處。故對學校而言，防治蟲鼠是非常重要的。雖然採用快速而有效的除害劑亦不失為緊急情況下滅除蟲鼠的可行方法，但妥善管理環境和保持環境清潔始終是最徹底而長遠的解決方法。

本小冊子旨在就本港學校常見的蟲鼠問題及其防治方法提供一般性的參考。

### 校園中常見的害蟲

#### 1. 蟑螂

大多數的學校均自設有廚房或茶房，讓學校職員為學生預備午餐，或製作一些簡單的食物。許多學校更設有食物部，向學生售賣零食。由於這些地方經常有食物放置，故很容易成為蟑螂出沒之處。除此之外，若飯堂、家政室和垃圾收集站的清潔及保養情況欠佳，蟑螂亦會在這些地方為患。要避免這個問題，便要格外注意這些地方的衛生情況。

#### 2. 蚊子

蚊子主要在校園內積水的地方繁殖，這些地方包括校園四周及露天操場的排水明渠、放置在花園一角的盆栽，以及放有花卉植物的辦公室。為了避免校園蚊蟲滋生，必須盡快清除積水。

#### 3. 家蠅

家蠅主要受食物、腐壞的有機物及垃圾所吸引。因此，放有食物的食物部和廚房、供丟棄食物的垃圾桶和垃圾收集站，以及有排泄物和污水的水渠，都可能成為家蠅滋生的地方。要避免學校受到家蠅滋擾，最有效及徹底的方法是清理這些地方，例如將食物妥為貯放、把垃圾完全密封包好，以及保持水渠暢通。

#### 4. 老鼠

可找到食物和供躲藏的地方均會招徠老鼠。一般來說，老鼠以人類的

食物作為食糧。校園內老鼠最常躲藏的地方包括花圃、被覆蓋的排水明渠、堆積的物品/垃圾，以及護土牆上的疏水孔等。要杜絕鼠患，最有效的方法莫如使其失去覓食及躲藏之所。另一個有效方法是採取防禦措施，阻止老鼠進入校園之內。

若你發現校園內蟲鼠為患，可與食物環境衛生署的分區防治蟲鼠組聯絡，亦可聘請防治蟲鼠公司為校園進行防治蟲鼠工作。

但必須緊記，解決蟲鼠問題的最終方法是保持環境高度整潔，校方亦可制定綜合蟲鼠治理計劃，以更有效和快捷的方法防治蟲鼠。

學校聘用的防治蟲鼠公司通常會使用除害劑來處理校內的蟲鼠問題。由於除害劑是含有一定程度毒性的化學品，故在物色防治蟲鼠公司為學校進行防治蟲鼠工作時，必須非常小心。

### 聘請防治蟲鼠公司為學校進行防治蟲鼠工作須注意事項

當聘請防治蟲鼠公司的時候.....

要求該公司

- 在使用除害劑前先進行蟲/鼠患調查；
- 使用在香港註冊的除害劑；
- 選用含有毒性較低的活性成分而能於低劑量產生功效的除害劑；
- 提供有關擬使用的除害劑的資料，包括其活性成分、所對付的蟲害類別及施用的方法；
- 提供有關工作的詳細程序；
- 提供有關防範和安全措施以及善後工作的資料；及
- 在放學後或學校假期內才進行防治蟲鼠的工作。

在正式進行防治蟲鼠工作前，學校職員應

- 在大規模地施用殺蟲劑前，通知附近可能受影響的居民；
- 搬走有關範圍內的所有食物和煮食器具；
- 關掉有關範圍內的所有中央空氣調節系統、直至建議可重新進入的時間為止；及
- 確保除有關的工作人員外，有關範圍內並無其他人逗留。

施用除害劑，學校職員應

- 直到建議的時間才重新進入經施用除害劑的範圍；
- 打開通向戶外的門窗，讓空氣得以流通；
- 清理現場留下的昆蟲屍體，切記穿上防護衣物如手套等方可進行有關工作；及
- 除非已到達建議可重新進入的時間，及有關範圍已被打掃或清理乾淨，否則不得讓學生入內。

上述只是有關施用除害劑時應採取的一般安全措施，校方應切實考慮執行防治蟲鼠人員所建議的防範措施，以確保有關的防治蟲鼠工作能以安全的方式順利地進行。

若身體沾上除害劑.....

皮膚沾上除害劑

- 立即以大量清水及肥皂清洗沾有除害劑的身體部分。

眼睛沾到除害劑

- 立即以清水沖洗眼部最少15分鐘，沖洗時要張開眼睛。

除害劑中毒的徵狀

- 覺得虛弱和疲倦
- 出汗過量
- 嘔吐
- 眩暈、思緒混亂
- 呼吸困難
- 皮膚敏感
- 腹痛、腹瀉
- 頭痛
- 視覺不清
- 肌肉抽搐
- 流涎過多
- 眼部發癢及灼痛
- 瞳孔收縮
- 失去知覺

若身體沾上除害劑或懷疑中了除害劑毒，應盡快延醫診治，避免花太

多時間自行急救。

若對有關蟲鼠的問題及其防治方法有任何疑問，可致電2319 8224向食物環境衛生署防治蟲鼠事務諮詢組查詢。

食物環境衛生署食物及公共衛生部出版  
政府物流服務署印(03/06)