

第6章

保持無鼠小區的鼠患防控策略

鼠患防控策略包括一系列的步驟。本章從不同方面，概述保持無鼠小區的整體鼠患防控計劃。只要市民齊心協力，鼠隻數目不但可以大幅減少，鼠患程度亦可維持在低水平。保持無鼠小區的策略搬述於附件I的流程圖。

綜合蟲鼠治理法

要建立和保持無鼠小區，可採用綜合蟲鼠治理方法。第一步是進行視察，確定為患的鼠類，找出問題所在；然後擬定防治建議以杜絕蟲鼠，同時選擇合適的治理方法解決鼠患，並持續評估治理成效。

視察

周詳的計劃是防治鼠患的成功關鍵。第一步是進行視察，目的是：

- 找出為患的鼠類和活動範圍，以及鼠隻的大概數目；
- 找出鼠隻藏匿的地方；
- 找出鼠隻的食物來源；以及
- 計劃策略性的防鼠行動及長遠的防治工作。

擬定防治計劃前須先徹底視察處所及周圍地方，查看鼠隻出沒的痕。視察時須配備電筒及其他防護裝備 (如手套、口罩等)。視察所得的資料應清楚地記錄下來。



建立及保持無鼠小區

有數個現象可顯示老鼠的活躍程度。由於老鼠通常在晚上活動，因此須要找出線索，查察老鼠的活動情況。這些現象包括：

看見老鼠



圖6.1 死老鼠

不論是活鼠抑或死老鼠，都可證實屋內有老鼠出沒。

鼠糞



圖6.2(左) 小家鼠的糞便

圖6.3(中) 屋頂鼠的糞便

圖6.4(右) 溝鼠的糞便

鼠糞通常見於老鼠藏匿及進食的地方。鼠糞的數量、位置及新鮮程度，都可為鼠隻的數目及活動範圍提供線索。新鮮的鼠糞，顯示附近一帶現時有老鼠出沒。鼠糞亦有助辨識為患的鼠類。



鼠洞

溝鼠(活躍於地面的家居老鼠品種)通常棲身於地上的鼠洞。然而，屋頂鼠亦有可能藏匿在空地洞內。經常有老鼠出沒的地洞孔口平滑而完整，附近可能會有鼠糞、擦迹、食物殘渣或鬆土。一個地洞通常會有2至3個孔口。



圖6.5 花床內的鼠洞

鼠隻的擦迹

老鼠身上有油脂分泌。老鼠走動時如經常擦到某件物件，經過一段時間後，該物件便會留下鼠隻的擦迹及油污漬。擦迹表示鼠患嚴重或已長時間存在，也揭示鼠道的走向。新的擦迹，或帶有油光的擦迹，顯示鼠隻仍然活躍。



圖6.6 鼠道可從老鼠留下的擦迹顯示

建立及保持無鼠小區

嚙痕



圖6.7(左) 鼠隻從咬爛了的木門進入處所



圖6.8(右) 被鼠隻咬過的蕃薯會留下平行嚙痕

老鼠的前齒(即門牙)會不斷生長，因此要啃咬物件以免門牙過長。老鼠能咬爛木頭、軟金屬及塑膠等物料。被老鼠咬過的物品會有平行嚙痕。

鼠道



圖6.9(左) 排水明渠內的隱蔽鼠道



圖6.10(右) 鼠隻以咬爛了的不常撥動的物品為通道

鼠隻依循相同的路線來往藏匿處和其他地點。鼠道經常會有擦迹和嚙痕(見圖6.6至圖6.8)。排水管、排水明渠、假天花及其他隱蔽地方都是鼠隻常用的通道。

