



就讓我來
詳細告訴
你們。



牠們叫白紋伊蚊，
胸背有白線，腳部有白間。牠們
的飛行能力不強，大約
100米。



雌蚊喜歡在白天叮人。
日出後兩小時及日落
前兩小時是牠們
活動的高峰時間。





白紋伊蚊喜歡在天然或
人造積水容器中滋生，如
棄置飯盒……等。





蚊卵產在水中

約7天後，蛻變為
成蟲。卵的抗旱力
極強。

成蟲



卵(2-3天)



蛹(1-3天)



孑孓(4-7天)





我明白啦！



被白紋伊蚊
叮咬，除會痕和痛外，
會否感染疾病呀？



白紋伊蚊會
傳播登革熱病。




感染登革熱是怎樣的？



登革熱會令人頭痛、發高燒、皮膚出紅疹、後眼窩疼痛、肌肉及關節痛，而登革熱所引起的併發症更有可能導致死亡。登革熱的潛伏期為3至14日。



哇，咁大件事！



如果不被牠叮咬，就要做好預防措施。

由於蚊子由卵變為成蟲
需時約7天，住戶應
每週視察家居。

立即行動

清除地面積水。

每週更換花瓶
內的水。

HOT

清除屋外冷氣
機托盤積水。



清除雪櫃
底盤積水。



清除盆栽
墊盤積水。

貯存的水要
蓋好，防止
蚊子接觸
水面。



每週至少一次更換
家居容器藏水，並
清洗墊盤以便將可
能存在的蚊卵擦掉。




那麼戶外的問題又
應該如何處理呢？



你們要清除溝渠及
排水渠內的垃圾及落葉，
以防淤塞。



其他防止蚊子
滋生的
措施也包括




關好貯水箱蓋




填封匙孔



用泥土將竹枝殘幹填封




經常清理排水渠，以防積水








經常清理落葉

戶外容器用蓋子蓋好
或放在有遮蔽的地方



還有 · · ·





你們也要 ...

我知，就是不要胡亂棄置空
汽水罐、食物盒、垃圾...。





我們通常都會在戶外活動，又應該怎樣做？



在衣服上施用驅蚊劑，避免逗留在草叢，穿上淺色長袖衫及長褲。

不要塗抹帶有氣味的化妝品，例如香水或潤膚露等。





如果在公眾地方見到有可
能滋生蚊子的環境，我們又
應該怎樣做？



你們可致電

1823 舉報



我們立刻回家
告訴爸爸和媽媽。

現在我再出發啦！
記住要防蚊呀！拜拜！