

吸血蠬的防治指引

吸血蠬的生態和特徵

吸血蠬體型細小，全身深色，是屬於蠬科的飛蟲。不論在鄉郊或市區，吸血蠬都對人類構成滋擾。只有雌性吸血蠬叮人，但牠們很少在室內叮人。由於牠們的口器短小，無法刺穿衣服叮人，因此身體外露部分往往較易受襲。在本港，叮咬人類的吸血蠬包括有環斑庫蠬和台灣蠬蠬。

吸血蠬會在密林間或偶爾在有遮陰的地方歇息。牠們作“之”字形飛行，通常不會飛越離滋生地 100 米的範圍，惟有可能被風吹而擴散。然而，若風速每小時超過 5.6 公里及溫度低於攝氏 10 度，便會阻礙吸血蠬的飛行。事實上，吸血蠬的生命很脆弱，乾涼的天氣會縮短其壽命。吸血蠬的幼蟲是水棲或半水棲動物，通常可在潮濕地方或污泥中找到。

吸血蠬的危害

吸血蠬叮所引致的發炎和不適可持續數天至數星期。抓搔使瘡癩惡化，更可導致細菌感染及延緩傷處癒合。不過，吸血蠬不算是傳播疾病給人類的重要病媒。

吸血蠬的防治

由於吸血蠬的滋生地範圍廣泛，而且並不明顯及難以識別，所以很難才能完全消滅其幼蟲。以下方法可減少吸血蠬的滋生：

- 利用犁田或排水方法減少泥土表面水分。
- 清除斜坡或花圃上的垃圾、落葉和其他枯萎植物，以及沙隔/ 排水明渠內的堵塞物(例如淤泥)。
- 定期修剪生長茂密的植物，令泥土表面多些暴露於陽光和空氣中。
- 如有需要，可施放殺蟲劑。

短暫防治方面，可以在吸血蠬的歇息地方直接噴灑即殺性殺蟲噴霧，以便控制吸血蠬的成蟲。

此外，可在適當地點設置捕蟲器，防止該等地點受到吸血蠬的侵襲，從而減低吸血蠬帶來的滋擾。

如有需要，可聘請滅蟲公司提供滅蟲服務。

個人保護措施方面，市民可安裝紗網(網眼小於 0.75 毫米)、穿長袖衫、長褲及按驅蟲劑標籤的指示使用驅蟲劑驅避吸血蠬。