

預防黃蜂襲擊和滋擾

黃蜂的生態和特性

黃蜂是與蜜蜂有親緣關係的昆蟲，外型易於辨別：身上有黃黑相間的條紋，腰部很窄，有兩對膜翅，腹部末端有螯針。

有些黃蜂蜂種獨自棲息於地洞、泥穴或竹樹莖腔；而對人類造成滋擾的蜂種是群居的，其紙狀蜂巢往往掛在樹上或依附在樓宇外部，常見的蜂種包括黑盾胡蜂（胡蜂）、黃腰胡蜂（大褐胡蜂）和果馬蜂（橄欖長腳胡蜂）。

胡蜂的蜂巢在結構上呈圓形或橢圓形，直徑約30厘米或以上，工蜂數量可達二萬隻；果馬蜂的蜂巢則沒有任何遮蓋，而且只有一層巢室，因此黃蜂數目會較小。

小蜂巢的入口位於底部，而大的蜂巢入口多略為偏向一邊，並可有多個入口。除非蜂巢受到滋擾或破壞，否則黃蜂不會成群離巢。

黃蜂通常攝食毛蟲等昆蟲，但也攝食花蜜和腐爛／過熟的果實。大群黃蜂聚集，通常是受食物所吸引。

黃蜂蜂后一般在春天挑選地點築巢，然後繁殖下一代。由於大部分黃蜂會於冬季來臨時死亡，所以蜂群和蜂巢很少存活超過一年。當天氣持續和暖，食物供應會較充裕，黃蜂數量會因而激增，築巢地點便可能有所短缺，致使黃蜂侵入民居。

螯傷

黃蜂會用螯針襲擊敵人以保護自己，而牠們可反覆使用其螯針。大部分人被螯傷後，會感到傷處腫痛和痕癢，不過反應因人而異。

避免受黃蜂襲擊

- 不要騷擾黃蜂，更不要攬動蜂巢，以免招引黃蜂襲擊；
- 蓋好食物和飲品，特別是熟的水果和汽水，因食物的氣味會吸引蜂群，尤其是含糖分的食物；
- 把垃圾放入密封的容器內；
- 避免赤腳在草叢或林木間行走；
- 避免到黃蜂經常出沒的地點；
- 避免使用有香氣的化粧品，亦要避免穿着顏色鮮豔或有圖案的衣服，以免吸引黃蜂；
- 黃蜂飛近時，應保持冷靜和慢慢走開；

- 如有可能被黃蜂襲擊，應避免頭部、口部和喉嚨被螫傷，例如可拉起部分衣服蒙在頭上（但不要阻礙視線），然後慢慢走開；
- 如被螫傷後反應過敏，應盡快延醫診治。

預防黃蜂滋擾

- 經常修剪樹木及翻鬆花圃的面層泥土，以減少黃蜂在樹上或泥土上築巢的機會；
- 避免栽種會長出多汁果實的植物，以免招惹黃蜂進入處所範圍；
- 不應在空曠地方擺放沒有蓋好的糖類食物及飲品，以免吸引黃蜂結集；
- 定期視察處所範圍的花園及空曠地方，以便及早發現黃蜂巢的存在。蜂巢築成初期只有少量黃蜂，所以較易毀滅。

食物環境衛生署
24小時熱線：2868 0000

食物環境衛生署出版
政府物流服務署印 (11/06)